

## レジメン情報 (5095\_レジメン名 Pola-R-CHP【同日】)

### (1) 基本情報

レジメン番号	5095	レジメン名	Pola-R-CHP	申請診療科	血液内科
がん種	悪性リンパ腫(DLBCL)	サイクル数	6	インターバル日数	21
留意事項等	<p>6 コース施行後は Rit 維持を 2 コース施行(計 8 コース)</p> <p>PSL100mg/body d1-5po(d1 は Rit 投与 1 時間前に内服)(注射でも可)</p> <p>カロナール 400 mg は Rit 投与 30 分以上前に内服、アプレピタント 3 日間内服</p> <p>G2infusion reaction 出現→G1 以下に回復するまで休薬、回復後はもとの速度で再投与可。</p> <p>G3infusion reaction 出現→G1 以下に回復するまで休薬、回復後はもとの速度の 1/2 の速度で再投与可。</p> <p>G4infusion reaction 出現→再投与はしない。</p>				

### (2) 薬剤情報

種別	名称	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	ソルデム 3A 500mL	500mL	d1	メインルート、フラッシュ用
Rp.2	パロノセトロン注 0.75mg/50mL ポララミン注 5mg	0.75mg 5mg	d1	30 分 点滴静注
Rp.3	リツキシマブ BS 点滴静注 生理食塩液バッグ 500mL	375mg/m <sup>2</sup> 500mL	d1	初回 25mL/h(1 時間)→100 mL/h→200 mL/h 2 回目以降 100 mL/h(1 時間)→200 mL/h 点滴静注
Rp.4	ポライビー点滴静注 蒸留水 20mL 生理食塩液 100mL	1.8mg/kg 右参照 100mL	d1	初回 90 分、2 回目以降 30 分まで短縮可 点滴静注 30mg/V→蒸留水 1.8mL/V、140mg/V→7.2mL/V で溶解 【20mg/mL】 インラインフィルター使用
Rp.5	ドキシソルピシン注 生理食塩液 50mL	50 mg/m <sup>2</sup> 50mL	d1	15 分 点滴静注
Rp.6	エンドキサン注 生理食塩液 100mL	750 mg/m <sup>2</sup> 100mL	d1	30 分 点滴静注