

レジメン情報（2004_レジメン名 FOLFIRI+Cmab 2回目以降）

（1）基本情報

レジメン番号	2004	レジメン名	FOLFIRI+Cmab 2回目以降	申請診療科	腫瘍内科
がん種	大腸がん	サイクル数	-	インターバル日数	14
留意事項等	ポート使用患者レジメン				

（2）薬剤情報

種別	名称	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食シリンジ 10mL	10mL	d1,8	穿刺時フラッシュ（ポート）
Rp.2	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	50mL	d1	30分 点滴静注
	ネオレスタール注 10mg/1mL	1mL		
	デキサート注	6.6mg		
Rp.3	生理食塩液 100mL	100mL	d8	30分 点滴静注
	ネオレスタール注射液 10mg/1mL	1mL		
	デキサート注	6.6mg		
Rp.4	アービタックス注射液	250mg/m ²	d1,8	1時間 点滴静注
	生理食塩液 250mL	250mL		
Rp.5	生理食塩液 100mL	100mL	d1,8	1時間 点滴静注
Rp.6	5%ブドウ糖 200mL	200mL	d1	2時間 点滴静注
	レボホリナート点滴静注用	200mg/m ²		
Rp.7	イリノテカン注	150mg/m ²	d1	2時間 点滴静注（レボホリナートの側管より同時投与）
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL		
Rp.8	フルオロウラシル注 5FU	400mg/m ²	d1	全開で 急速点滴静注
	5%ブドウ糖 100mL	100mL		
Rp.9	フルオロウラシル注 5FU	2400mg/m ²	d1	トレフューザーポンプで 46時間 持続点滴静注 計 130mL と なるように調製
	5%ブドウ糖 100ml	100mL		
	ヘパリンナトリウム注 5000 単位/5mL	5mL		