

## レジメン情報 (3038\_レジメン名 FOLFOXIRI+BV)

### (1) 基本情報

レジメン番号	3038	レジメン名	FOLFOXIRI+BV	申請診療科	腫瘍内科
がん種	大腸がん	サイクル数		インターバル日数	14
留意事項等	イメンド併用、12回まで、その後は維持療法 (5-FU+LV+Bmab) PLT:10万/mm <sup>3</sup> 、Hb:9g/dL以上 JACCRO CC-13A群を参考に登録				

### (2) 薬剤情報

種別	名称	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食シリンジ 10mL	10mL	d1	穿刺時フラッシュ (ポート)
Rp.2	アロキシ点滴静注 0.75mg/50mL	50mL	d1	30分 点滴静注
	デキサート注 6.6mg/2mL	6.6mg		
	デキサート注 1.65mg/0.5mL	3.3mg		
Rp.3	生理食塩液 100mL	100mL	d1	90分で 点滴静注 2回目 60分、3回目以降 30分で可能
	アバスチン点滴静注用	5mg/kg		
Rp.4	5%ブドウ糖注 500mL	500mL	d1	90分で 点滴静注
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150mg/m <sup>2</sup>		
Rp.5	5%ブドウ糖 200mL	200mL	d1	2時間で 点滴静注
	レボホリナート点滴静注用	200mg /m <sup>2</sup>		
Rp.5	5%ブドウ糖注 500mL	500mL	d1	Rp5の側管より 2時間点滴静注 (レボホリナートと同時投与)
	オキサリプラチン点滴静注液	85mg /m <sup>2</sup>		
Rp.6	5%ブドウ糖 200ml	100mL	d1	トレフューザーポンプで 46時間 持続点滴静注 Total 130mLとなるよう調製
	ヘパリンナトリウム注 5000単位/5mL	5mL		
	フルオロウラシル注 5FU	2400mg /m <sup>2</sup>		